



KALAMAZOO COUNTY GOVERNMENT

In the Pursuit of Extraordinary Governance...

**AVISO DE PRENSA
PARA AVISO INMEDIATO**
19 de Septiembre, 2022

Matt Johnson
Public Information Officer
pio@kalcounty.com

Caso Probable de MPV (Viruela Símica) Identificado en el Condado de Kalamazoo

KALAMAZOO, MI – El Departamento de Salud & Servicios Comunitarios del Condado de Kalamazoo (HCS) informa un caso probable de MPV (viruela Símica). El paciente se encuentra actualmente aislado y no representa un riesgo para el público. El equipo de enfermedades transmisibles de HCS del condado de Kalamazoo está identificando y monitoreando cualquier contacto cercano para detectar síntomas. No se han identificado casos adicionales en este momento. Para proteger la privacidad del paciente, no se proporcionarán más detalles del caso. Kalamazoo County HCS ha creado una [página web](#) para obtener información sobre MPV, que incluye información general sobre MPV, recuento de casos y criterios de elegibilidad para vacunas.

“En este momento, el riesgo de contraer MPV sigue siendo bajo en el condado de Kalamazoo”, dijo Jim Rutherford, oficial de salud del condado de Kalamazoo. “HCS recomienda, sin embargo, que los residentes del condado de Kalamazoo permanezcan atentos cuando se trata de prevenir MPV. Continuaremos trabajando con todos nuestros socios comunitarios estatales y locales para mantener informados a los residentes sobre su riesgo y los mejores métodos de prevención. Si le preocupa su riesgo de contraer MPV, no dude en comunicarse con su médico o el departamento de salud para obtener información.”

Hasta el 18/09/22, se han identificado 246 casos confirmados de viruela del mono en Michigan. El riesgo es bajo para el público en general, pero es importante conocer los signos y síntomas de MPV. Los síntomas iniciales de MPV pueden incluir fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares o de espalda, ganglios linfáticos inflamados, escalofríos y agotamiento. Luego aparece una erupción poco después o junto con estos síntomas y puede parecer granos o ampollas que pueden aparecer en la cara, dentro de la boca y en otras partes del cuerpo, como las manos, los pies, el pecho, los genitales o el ano.

La enfermedad suele durar de dos a cuatro semanas. El virus se transmite de persona a persona por contacto directo con el sarpullido, las llagas o las costras de una persona con MPV. El MPV se puede transmitir durante las relaciones sexuales a través del contacto piel con piel y otros contactos sexuales íntimos (como besos, caricias o masajes). Las rutas de transmisión menos comunes incluyen las gotitas respiratorias del contacto cara a cara prolongado o el contacto con materiales contaminados, como

HEALTH AND COMMUNITY SERVICES DEPARTMENT

311 E. Alcott St. | Kalamazoo, MI 49001

Phone: 269.373.5200 | www.kalcounty.com/hcs

ropa o ropa de cama. El HCS del condado de Kalamazoo recomienda a cualquier persona que experimente signos y síntomas de MPV que se comuniquen con su proveedor de atención médica para una evaluación y posibles pruebas.

No existen tratamientos específicos para las infecciones por MPV. Sin embargo, el MPV y los virus de la viruela son genéticamente similares, lo que significa que los medicamentos antivirales y las vacunas desarrolladas para proteger contra la viruela pueden usarse para prevenir y tratar las infecciones por MPV. La mayoría de las personas no necesitan una vacuna MPV en este momento. Sin embargo, el HCS del condado de Kalamazoo está vacunando a las personas elegibles para prevenir la infección de la viruela del mono según los criterios específicos que se enumeran en nuestra página web. Si alguien ya estuvo expuesto, recibir una vacuna MPV dentro de los 4 días puede prevenir la aparición de la enfermedad. Vacunarse entre 4 y 14 días después de la exposición puede reducir los síntomas de la enfermedad.

Si cree que tiene MPV o puede haber estado expuesto:

- Consulte a su proveedor de atención médica o comuníquese con su departamento de salud local para coordinar las pruebas.
- Evite tener relaciones sexuales o tener intimidad con nadie hasta que haya sido examinado.
- Evite las reuniones, especialmente si involucran un contacto cercano, personal, de piel con piel.
- Piense en las personas con las que ha tenido contacto cercano, personal o sexual durante los últimos 21 días, incluidas las personas que conoció a través de aplicaciones de citas. Para ayudar a detener la propagación, se le puede pedir que comparta esta información con el departamento de salud local si recibe un diagnóstico de viruela del simio.

Para obtener más información sobre MPV en el condado de Kalamazoo, visite:

www.kalcounty.com/hcs/monkeypox.php Para obtener información sobre Monkeypox del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan, visite: <https://www.michigan.gov/mdhhs/mantener-mi-saludable/enfermedadestransmisibles/enfermedadeseinmunización/mpv>

###

Kalamazoo County Government
Health & Community Services Department

Follow us on:



[Facebook](#)



[Twitter](#)



[Instagram](#)